

Ehlersi, Oertzeni, Hopffgarteni, Stussineri. *Pselaphus* *Capiscus*, *Revelierei*, *argutus*, *Ganglbaueri*, *Simonis*; *Tychus* *angulifer*, *rufopictus*, *anophthalmus*, *Lenkoranus*, *integer*, *Corsicus*, *dentifrons*, *grandiceps*; *Zibus* *adustus*, *laeviceps*; *Philus* *Aubei*; *Trichonyx* *Talychensis*; *Euplectus* *Aubeanus*, *Carpathicus*, *Bescidicus*, *occipitalis*, *afer*, *Bonvouloiri*, *Narentinus*; *Bibloporus* *variicolor*; *Trimium* *Diecki*, *imitatum*, *Domogleti*, *Aemonae*. — *Euthia* *formicetorum*; *Cephennium* *Nicaeense*, *maius*, *difficile*, *simile*, *Carnicum*, *Hungaricum*, *Algeciranum*, *Judaeum*, *apicale*, *Aubei*, *minimum*, *rotundicolle*; *Neuraphes* *Lederianus*, *solitarius*, *eximius*, *Capellae*, *leptocerus*, *tenuicornis*, *Margaritae*, *proximus*, *similaris*, *Ehlersi*, *Titan*, *pusillus*, *dubius*, *Brucki*, *Diocletianus*, *nigrescens*, *Revelierei*; *Scydmaenus* *Damryi*, *Baudii*, *leptoderus*, *microphthalmus*, *picipennis*, *globulipennis*; *Euconnus* *barbatulus*, *puniceus*, *robustus*, *sanguinipennis*, *Gredleri*, *Kraatzii*; *Eumicrus* *Olivieri*, *Georgi*, *Spartanus*, *Perrisii*; *Eudesis* *aglena*; *Leptomastax* *sublaevis*. Die beigegebene Tafel XIX enthält 81 bildliche Darstellungen von Fühlern. S. 443—592.

Ganglbaur theilt die Cerambyciden in 2 Subfamilien ein: Cerambycitae und Lamiitae (entsprechend Thomson's *Anaulacnemiteae* und *Metaulacnemiteae*); die Cerambycitae in 3 Hauptgruppen: Lepturini, Cerambycini, Prionini. Der erste Theil geht bis zu den Prioninen, S. 681—758. Die beigegebene Tafel erläutert Körpertheile der Larven und Käfer.

K.

Literatur.

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. 1881. XXXI. Bd., II. Halbjahr. 1882.
(Entomol. Inhalts.)

A. Sitzungsberichte.

Rogenhofer, A., über Hauptflugjahre des Maikäfers, S. 24.
Derselbe, *Sarothripa nilotica*, eine neue Nycteolide aus Egypten, S. 26.

Lichtenstein, J., über die pupifere Form von *Vacuna alni*, 30.

B. Abhandlungen.

Mik, Jos., dipterologische Mittheilungen, II, 315—330. Mit Taf. XVI. Zwei neue Arten: *Lasiopa Mannii* ♂♀ von

- Brussa und Triest; *Dicratona Reitteri* ♂♀ aus Südtirol.
Die Gattung *Clinocera* Meig. Ueber die systematische
Stellung des Genus *Hilarimorpha* Schin.
- Reitter, E., zur Pselaphiden- und Scydmaeniden-Fauna Sy-
riens, 331—36.
- Osten-Sacken, C. R., Verzeichniss der entomologischen
Schriften von Camillo Rondani, 337—44.
- Mik, Jos., einige Worte über P. Gabriel Strobl's „dipterolo-
gische Funde um Seitenstetten“, 345—52. Berichtigungen.
- Derselbe, dipterologische Mittheilungen, III, 353—58. Ueber
Tipula atomaria Deg. Das Männchen von *Mochtherus*
flavipes Meig. *Diaphorus Gredleri* n. sp. von Bozen.
- Möschler, H. B., Beiträge zur Schmetterlingsfauna von Su-
rinam IV, 393—442. Mit 2 Taf.
- Reitter, E., Bestimmungstabellen der europäischen Coleo-
pteren. V. Enthaltend die Familien: Paussidae, Clavi-
geridae, Pselaphidae und Scydmaenidae, 443—592.
- Rogenhofer, A., und Dr. K. W. v. Dalla Torre, die
Hymenopteren in J. A. Scopoli's *Entomologia Carniolica*
und auf den dazu gehörigen Tafeln kritisch behandelt;
593—604.
- Schaufuss, L. W., und Dr. L. Koch, zoologische Ergeb-
nisse von Excursionen auf den Balearen, 619—78. Mit
2 Tafeln. Coleoptera, Arachniden und Myriopoden. Neue
Arten: *Helophorus Punientanus*, *filitarsis*; *Stenus tythus*;
Lasioderma bicolor; *Phylax balearicus*.
- Ganglbauer, L., Bestimmungstabellen der europäischen
Coleopteren. VII. Cerambycidae, 1 Theil., 681—758.
Mit einer Tafel.
- Mittheilungen der schweizerischen entomolo-
gischen Gesellschaft. Vol. VI, Heft 5. 1882.
- Stoll, O., über die Wanderheuschrecke von Central-Amerika,
Schistocerca (Acridium) peregrina Cl., 199—211. Vor-
kommen, Entwicklung, Feinde.
- Bericht über die 24. Sitzung der schweizerischen entomolo-
gischen Gesellschaft am 7. August 1881 in Aarau,
211—15.
- Liniger, E., die Odonaten des bernischen Mittellandes,
215—39. Vorkommen.
- Nekrolog des Dr. E. Schindler, 230—31.
- Christ, *Erebia Eryphyle* Freyer, 231—39.
- Derselbe, *Erebia Pyrrha* Fab. var. *vogesiaca*, 239—43.

Nachruf (Johann Chr. Rothenbach), 243—50.

Stierlin, Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer, 250—56.

Otiorhynchus Dobrutschae, Türkei; O. parvulus, Türkei;
Erirhinus Merkli, Südungarn; Cionus Merkli, Türkei;
Trachodes Heydeni, Kroatien; Meira Grouvellei, Mentone.

• The Entomologist's Monthly Magazine.

London, 1882. Nr. 212, Januar.

Saunders, Edw., notes on the entomology of Portugal; VI.

Hymenoptera Aculeata, Forts., 169—71. Neu: Panurgus
Perezi; Anthophora Thomsoni.

Meade, R. H., annotated list of British Anthomyiidae, Forts.,
172—76.

Barrett, C. G., notes on British Pterophoridae, 177—80.

Buckler, William, natural history of Emmelesia blandiata,
180—84.

Parfitt, E., a new species of Hemiteles (H. persector aus
Puppen von Gyrinus natator), 184—85.

Barrett, C. G., notes, on British Tortrices, Forts., 185—86.
Neu: Brachytaenia Woodiana.

Nr. 213, Februar.

Cameron, P., notes on Tenthredinidae, Forts., 193—95.
Neu: T. scotica; Nematus glutinosae; N. salicivorus.

Buckler, W., descr. of the larva etc. of Hydroecia nictitans,
195—97.

Saunders, Edw., on 5 neu British Hymenoptera; with a
synoptical table of the genus Sphecodes, 197—200. Nur
für England neue Arten.

Meade, R. H., annotated list of British Anthomyiidae, Forts.,
201—5. Neu: Homalomyia spissata.

McLachlan, R., measurements in descriptive entomology;
a suggestion, 205—7. Millimetermass allgemein empfohlen.

Eaton, A. E., an announcement of new genera of the Ephemeridae, Ergänzung, 207—. Neue Genera: Hagenulus,
Teloganodes, Leptohypes.

Nr. 214, März.

Stainton, H. T., a few words about Epischnia (Anerastia)
Farrella, 217—19.

Mathew, Gerv. F., life history of Callidryas drya Boisd.,
219—20.

Meade, R. H., Forts. des Verzeichnisses der brit. Anthomyiidae, 221—24.

- Lichtenstein, J., alternative of generation in the Cynipidae, 224—27.
 Butler, A. G., on the butterflies of the genus *Teracolus* occurring at Accra, gold coast, 227—30.
 Bates, H. W., notes on the entomology of Portugal. VII. Coleoptera, 230—33.
 Atmore, E. A., notes on the Lepidoptera of West-Norfolk, 239—40.
-

Verzeichniss Palaearctischer Hemipteren,*)

beschrieben v. December 1875 bis Januar 1879 von Dr. O. M. Reuter.

Heteroptera.

Pentatomidae.

- Sphenaspis Jakovl.* Trudi Russk. ent. 1876—1877, p. 72, (Separat-Abdruck); *curculionoides* Jak. Nord-Persien.
Polyphyma Jak. l. c. p. 73; *scrobiculata* Jak. p. 74. Nord-Persien. (mit *Psacasta* verwandt.)
Arctoconis (= Irochrotus) caspicus Jak. Bull. Soc. imp. Mosc. 1875, III, 146, Sarepta; *caucasicus* Jak. l. c. IV, 149, Caucasus.
Trigonosoma Putoni Jak. Trudi 1876—1877, p. 75. Nord-Persien.
Dybovskya Jak. Bull. Mosc. 1876, III, 85 (nahe *Ancyrosoma* und *Psacasta*); *ussurensis* Jak. 87, Ussuri - Ost-Sibiren.)
Podops annulicornis Jak. Bull. Mosc. 1877, II, 280. Sarepta.
Cydnus ovatus Jak. l. c. 282. Astrakhan.
Gnathoconus validus Jak. Trudi 1876—1877, 76. Nord-Persien.
Menaccarus divaricatus Jak. l. c. 76, Nord-Persien.
Mustha incana Stål. En. Hem., V. 48, Persien; *dentata* Jak. l. c. 1876—1877, 78. Persien, ist mit voriger synonym, nach Originalen von Jakovleff.
Neottiglossa metallica Jak. Bull. Mosc. 1876, III, 88. Ussuri.

*) Zwar haben wir im vor. Jahrgang bereits ein Verzeichniss der neuen Hemipteren Europa's aus der Feder des Herrn von Horvath gebracht, wir stehen indessen nicht an, auch dies eine weitere Zone umfassende zu bringen, trotzdem sich manche Arten des früheren wiederfinden.

D. Red.